

# FORMA DE APLICACIÓN

AminoBact.sil



AminoBact.sil  
fertilizante líquido



Agita perfectamente  
la garrafa de AminoBact.sil

PASO  
1

PASO  
2



En un tambo de  
**200 litros de agua**,  
mezcla bien  
**la cantidad  
indicada** de  
AminoBact.sil

AminoBact.sil  
fertilizante líquido



Mezcla perfectamente la dosis  
recomendada de AminoBact.sil en un  
tambo de 200 litros de agua y aplica  
directo a la raíz.

**RECUERDA HACERLO  
ÚNICAMENTE  
SOBRE SUELO HÚMEDO**

después de una lluvia intensa  
o tras el riego.

PASO  
3

PASO  
4



## PRIMERA APLICACIÓN

Aplicar en drench con chorro grueso  
directamente al macollo / al suelo / raíz  
ÚNICAMENTE SOBRE SUELO HÚMEDO  
ya sea después de una lluvia intensa o tras el riego.

# Fertilizante Orgánico

Multienzimático | Enriquecido

# POTENCIALIZADOR y/o SUSTITUTO de NITROGENADOS

# AminoBact.sil

## Fertilizante Orgánico Multienzimático Enriquecido

Actúa como biocatalizador natural que restituye el equilibrio, salud y fertilidad de todo tipo de suelo proporcionándole vida, además de optimizar la absorción de las sales y fertilizantes químicos.



- ✓ **Es más económico y eficiente que los fertilizantes químicos**
- ✓ **Sustituye y/o potencializa los químicos y abonos orgánicos**
- ✓ **Mantiene o mejora la producción que se obtiene con fertilizantes químicos**
- ✓ **Mejora sustancialmente la presencia de nutrientes y las condiciones del suelo**
- ✓ **De fácil aplicación, por lo que reduce costos de operación**
- ✓ **Ayuda a prevenir enfermedades**

# APLICACIÓN

Para potenciar la acción de AMINOBACT Sil, debe aplicarse sobre suelo húmedo, después de la lluvia, siempre y cuando se pueda caminar o sea posible la entrada de maquinaria.

## CULTIVOS DE TEMPORAL O RIEGO RODADO

- Aplicar en banda o en línea dependiendo de cómo se estableció o sembró el cultivo (en surcos o melgas, camas, etc.)
- Utilizar desde 200 hasta 400 litros de agua dependiendo de la forma de aplicación.
- Puede aplicar con bomba manual caminando de forma normal, no aprisa, o con maquinaria agrícola (aspersor) agregando la dosis recomendada del producto.
- De preferencia, aplicarlo con boquilla de abanico, como si estuviese aplicando herbicida, procurando que el(los) producto(s) caigan en el suelo impregnando o mojando también la planta.
- Amimnobact se puede aplicar mezclado con otros tipos de fertilizantes biológicos o químicos, NO MEZCLAR CON POTASIO, HERBICIDAS O PRODUCTOS ALCALINOS COMO HIDRÓXIDO DE CALCIO NI BACTERICIDAS.

## RIEGO POR ASPERSIÓN (PIBOTE CENTRAL O ASPERSORES)

- Aplicar el producto en el último tercio del riego.

## RIEGO PRESURIZADO (GOTEO Y/O MICRO ASPERCIÓN)

- Diluir el producto en una solución madre y aplicarlo después de haber cargado el sistema de riego con agua simple.
- Posteriormente inyectar la solución madre específica.

## ¡IMPORTANTE!

- Antes de elaborar la mezcla, agite vigorosamente el producto en su envase.
- Aplicar en suelo húmedo; NUNCA en superficies secas.
- NO MEZCLAR con potasio, herbicidas o con productos altamente alcalinos como cobres, hidróxido de calcio ni bactericidas.
- En caso de hacer aplicaciones preventivas o correctivas de bactericidas, esperar al menos 4 días para aplicar el AMINOBACT SIL.