

PROGRAMA NUTRICIONAL POTENCIALIZADOR PIÑA

Sustitución: N100%-P50%

PIÑA S.N100-P50

PLAN POTENCIALIZADOR DE NITROGENADOS

Combinando Fertilizantes Habituales + Aminobact Sil

**ESTE PROGRAMA SUSTITUYE LA APLICACIÓN DE
100% DE NITRÓGENO Y 50% DE FÓSFORO**

PRODUCTO	CANTIDAD POR HA	APLICACIÓN
VITABLOOM Advanced	4 Litros	Primera 20 a 30 días después de trasplante
	6 Litros	Segunda 40 días después de la primera
	8 Litros	Tercera 40 días después de la segunda

**Aplicar este programa COMBINADO CON LA FERTILIZACIÓN HABITUAL,
SUSTITUYENDO el 100% de la fuente química/mineral de NITRÓGENO y 50% de
FÓSFORO por las dosis indicadas de AMINOACT**

OPCIONAL. FUNGICIDA-NEMATICIDA-BACTERICIDA DE PREVENCIÓN

Fungy
BLOOM

Aplicación foliar, 4KG diluidos en 200 lts de agua cada 15 días. En temporada de lluvia aplicar una vez por semana.

- Aplicar **asperjando 90% al SUELO y 10% al follaje**
- **SIEMPRE A SUELO HÚMEDO**
- Diluir cada dosis en **200 Lts de agua**
- **No mezclar con otros productos**
- Siempre **después de fertilización química y/o foliares**
- En caso de hacer aplicaciones preventivas o correctivas de bactericidas, dejar un periodo de al menos 4 días antes de aplicar nuestros productos.
- **Evitar aplicación en horas de calor**, de preferencia aplicar muy temprano o por la tarde, **NUNCA A SUELO SECO**
- Antes de aplicar, **AGITE VIGOROSAMENTE EN SU ENVASE**

SUSTITUCIÓN PARCIAL

Con una
sustitución parcial
se logran **3 objetivos**
fundamentales para el productor:

1
**Solución a la
escasez o
carestía de
nitrogenados**
asegurando **iguales o
mejores rendimientos**
en cosecha.

2
**Reducción de
costo de
fertilización**
en relación al precio
actual (2021) de la **urea**
y otros nitrogenados.

3
**Aportación de
nutrientes básicos
y otros muchos
elementos**
mejorando su asimilación
en calidad y cantidad
sin poner en riesgo
la cosecha o
rendimiento



****IMPORTANTE:** La sugerencia nutricional es orientativa, recomendada para sustitución de los porcentajes indicados de N y P basados en las unidades específicas requeridas por el cultivo en condiciones normales. Las condiciones ambientales, manejo, aplicación de foliares, riego y control de plagas y maleza son determinantes para un buen desarrollo del cultivo.

El programa está diseñado para comenzar a fertirrigar a partir de la semana 1. Se sugiere durante el desarrollo del cultivo realizar análisis foliares y de ser necesario, ajustar las dosis recomendadas inicialmente.

Este programa es un ejemplo de sustitución. Para sustitución de un mayor porcentaje de N y P, **consulte a nuestro distribuidor o contáctenos**. Basados en análisis de suelo, agua y planta también es posible hacer la recomendación de un programa corrector de deficiencias en el suelo o carencias nutricionales puntuales de la planta.

