ALGASIL®

Es un extracto a base de polvo de algas y pastos marinos hidrolizadas que se obtienen de diversas extracciones biotecnológicas enriquecido con ácidos húmicos, fúlvicos, carboxílicos y minerales naturales entre los que se incluye el Silicio (Si), para potencializar los efectos sinérgicos de los procesos del suelo y plantas.

Los micronutrientes de ALGASIL están en forma de quelatos naturales por los ácidos orgánicos que contiene (ácidos algínico y manitol) y son los que proporcionan y favorecen el color y el vigor de las plantas. Entre 60 y 70 elementos traza ya quelatados.

Guía de Aplicación

- FOLIAR.- En general, al ser aplicado al follaje, se debe asperjar después de un riego y durante el crecimiento activo del cultivo para lograr un mejor resultado.
- Para tener mejores efectos y favorecer una mayor absorción se recomienda realizar las aplicaciones muy temprano por la mañana o al atardecer con el propósito de que el producto quede impregnado el mayor tiempo posible en los tejidos y pueda absorberse mejor.
- AL SUELO.- Se puede aplicar por los diversos sistemas de riego presurizados junto con los fertilizantes, en la última etapa del riego.
- Mezclarlo bien con suficiente agua para obtener una mejor cobertura del follaje
- Preparación de La Mezcla Al mezclar incorpore primero ALGASIL® en la mitad del volumen total de agua que va a utilizar, si se va a mezclar con otros productos, adicionar posteriormente el resto de los productos y complementar el volumen total de agua todo esto agitando constantemente la mezcla

Consulte siempre a su técnico especialista en nutrición para las recomendaciones apropiadas de acuerdo al cultivo, condiciones de suelo, etapa fisiológica y densidad de plantación

Fabricado por Guanómeros de México, SPR de RL
Comercializadora: MANAGEMENT COMERCIAL
INTELIGENTE, SAS DE CV. Bruma 3798C. Valle del
Ángel, CP 72040 Puebla, México
contacto@vitabloom.mx +52 222 910 1128 / +52
222 662 0940

Dosis Generales

Cultivos Anuales, Granos, Cereales, Hortalizas	AL SUELO: 2 a 3 LT/Ha junto con el resto de los fertilizantes, iniciando las aplicaciones 2 semanas después de la emergencia y posteriormente cada semana
	FOLIAR: 1 a 3 ml/lt de agua 2 semanas después de la emergencia y posteriormente cada semana
Frutales Mayores de Temporal Mangos, Tamarindos, Jaka	Suelo: de 2 a 4lt/ha por aplicación realizando de 3 a 4 aplicaciones por año, en mezcla con los fertilizantes
	Foliar: 1 a 3 ml/lt de agua iniciando el brote floral hasta el último tercio de la formación de la fruta.
Frutales Mayores con Riego	AL SUELO: 2 a 3 LT/Ha junto con el resto de los fertilizantes, iniciando las aplicaciones 2 semanas después de la emergencia y posteriormente cada semana
	Foliar: 1 a 3 ml/lt de agua iniciando el brote floral hasta el último tercio de la formación de la fruta.
Limonos y Cítricos con Riego, Carambolo, Mangostan, Litchies	AL SUELO: 2 a 3 LT/Ha junto con el resto de los fertilizantes, iniciando las aplicaciones 2 semanas después de la emergencia y posteriormente cada semana.
	Foliar: 1 a 3 ml/lt de agua iniciando el brote floral hasta el último tercio de la formación de la fruta.
Viñedos, Duraznos, Manzanas, Ciruelos y Perales	Suelo: de 2 a 3 lt /ha cada 2 semanas una vez que se inicien los brotes después de la hibernación.
	Foliar: 1 a 3 ml/lt de agua 2 semanas de iniciando los brotes vegetativos después de la hibernación y hasta el último tercio de la formación de la fruta.

Producto quelatado enriquecido con ácidos Húmicos, Fúlvicos, y minerales naturales entre los que se incluye el Silicio (Si), para potencializar los efectos sinérgicos de los procesos del suelo y plantas, idóneo para todo tipo de agricultura.

Micronutrientes que ayudan a corregir las deficiencias causadas por el PH incorrecto del suelo. Es un complemento a la nutrición para poder trabajar en PH adverso y poder asimilar los micronutrientes de manera rápida.

No es fitotóxico en los cultivos y dosis aquí recomendados. No hacer mezclas con productos de reacción alcalina ni bactericidas químicos ni con otros productos sin hacer pruebas previas que demuestren compatibilidad.

El carácter BIO-TECNÓLOGICO de, VITABLOOM AminoK® le permite estar libre de las bacterias nocivas para la salud de los humanos (como E. Coli, Coliformes y Salmonella), porque en sus ingredientes NO SE INCLUYEN ESTIERCOLES ni sus derivados.

Beneficios:

VITABLOOM AMINOK Aumenta la capacidad del intercambio catiónico (CIC). | Incrementa la absorción de nutrientes por la raíz por la disponibilidad de enzimas que contiene y por la acción sinérgica del Silicio (Si.) | Fisiológicamente y físicamente, mejora la resistencia a situaciones de estrés por las condiciones ambientales de altas temperaturas, heladas y sequías. | Por su contenido de aminoácidos estimula los procesos fisiológicos de las plantas, mejora el metabolismo de las plantas, potencializa la síntesis de clorofila, mejora la calidad del fruto y estimula el crecimiento de las raíces retardando el envejecimiento de las plantas.

Guía de Aplicación

No aplique en horas de calor intenso, ni cuando exista alta probabilidad de lluvia, ni cuando la velocidad del viento sea alta.

Agítese vigorosamente antes de usarse.

Al mezclar incorpore primero VITABLOOM AminoK® en la mitad del volumen total de agua que va a utilizar, si se va a mezclar con otros productos, adicionar posteriormente el resto de los productos y complementar el volumen total de agua todo esto agitando constantemente la mezcla.

AL SUELO:

- Se puede aplicar por los diversos sistemas de riego presurizados junto con los fertilizantes, en la última etapa del riego.

FOLIAR

- Se debe asperjar después de un riego y durante el crecimiento activo del cultivo para lograr un mejor resultado.
- Mezclarlo bien con suficiente agua para obtener una mejor cobertura del follaje

Dosis Generales

4 a 5 litros de VITABLOOM AminoK® 4 veces con intervalos de 4 semanas

NOTA: Consulte siempre a su técnico especialista en nutrición para las recomendaciones apropiadas de acuerdo a la etapa fisiológica del cultivo y la densidad de plantación

www.vitabloom.mx

Fabricado por Guanómeros de México, SPR de RL Comercializadora: MANAGEMENT COMERCIAL INTELIGENTE, SAS DE CV. Bruma 3798C. Valle del Ángel, CP 72040 Puebla, México contacto@vitabloom.mx +52 222 910 1128 / +52 222 662 0940

Estimulador bioactivo de crecimiento y corrector de carencias formulado con una concentración de sustancias húmicas, fúlvicas y ácidos carboxílicos derivados de lignitos altamente oxidados, fortalecido con un ácidos Silícicos, especialmente para todo tipo de suelos y de manera foliar.

Puede aplicarse a todos los cultivos agrícolas y hortícolas, recomendado para usarse conjuntamente en programas de fertilización orgánica y/o convencional integral.

www.vitabloom.mx

Fabricado por Guanómeros de México, SPR de RL
Comercializadora: MANAGEMENT COMERCIAL INTELIGENTE, SAS DE CV. Bruma 3798C. Valle del Ángel, CP 72040 Puebla, México
contacto@vitabloom.mx +52 222 910 1128 / +52 222 662 0940

VITABLOOM HUMIK® es compatible con productos de reacción ácida y alcalina, por lo que puede usarse conjuntamente en aplicaciones de fatigación o foliares. Siempre debe realizar pruebas de compatibilidad antes de realizar la mezcla final.

Beneficios:

Estimula el crecimiento vegetal por una producción elevada de biomasa | Aumenta el rendimiento y mejora la calidad de las plantas | Estimula las enzimas de las plantas | Mejora la estructura del suelo y la capacidad de retención de agua | Aumenta y estimula la actividad microbológica de los suelos | Mejora la eficacia de los fertilizantes y reduce las pérdidas de nutrientes, especialmente la lixiviación de nitrato | Favorece el crecimiento de las raíces | Aumenta la permeabilidad de las membranas celulares de las raíces y la absorción de los nutrientes | Actúa como quelato natural para los micronutrientes en suelos alcalinos y aumenta su disponibilidad para las plantas | Reduce estrés causado por sequía, heladas y estrés causado por la aplicación de pesticidas | Aumenta la germinación de semillas y mejora el desarrollo radicular | Reduce los residuos de herbicidas y de sustancias tóxicas en el suelo | Aumenta la capacidad del intercambio catiónico (CIC)

Guía de Aplicación

AL SUELO:

- Se puede aplicar por los diversos sistemas de riego presurizados junto con los fertilizantes,
- Si no se cuenta con sistemas de riego presurizados se puede aplicar en banda después del riego una vez que las características del suelo permita el paso de maquinaria y/o del personal, con boquilla de abanico TK 3 o 4, ya sea solo o con la mezcla de fertilizantes

FOLIAR

- Mezclarlo bien con suficiente agua para obtener una mejor cobertura del follaje

Al mezclar incorpore primero VITABLOOM HUMIK® en el volumen total de agua que va a utilizar, adicionando posteriormente el resto de los productos

Dosis Generales

Producción de Plántula	1 a 2 ml/lit de agua en mezcla con los fertilizantes
Al Transplante	0.5 a 1 lit/ha en mezcla con los fertilizantes
Aplicaciones al Suelo	De 2 a 5 lit/ por Ha. Por semana solo o en mezcla con los fertilizantes en las etapas más críticas de desarrollo del cultivo
Aplicaciones Foliares	a 2 ml/lit de agua en mezcla con los productos foliares

Formulado por diversas mezclas multienzimáticas de origen natural para lo cual se utilizan diversos procesos biotecnológicos de sustancias MINERALIZADAS de origen marino, y animal. Adicionalmente, está fortalecido con ácidos silícicos y mas de 43 cepas de microorganismos Fito benéficos.

Biocatalizador orgánico natural sobre la materia orgánica propia de los suelos y de la que adicionalmente se le proporciona transformándola en nutrientes disponibles para la planta, principalmente N,P,S, micronutrientes, enzimas y aminoácidos.

NOTA: Estas son **dosis generales para algunos cultivos.**

Consulte siempre a su técnico especialista en nutrición para las recomendaciones apropiadas de acuerdo al cultivo, condiciones de suelo, etapa fisiológica y densidad de plantación

www.vitabloom.mx

Fabricado por Guanómeros de México, SPR de RL
Comercializadora: MANAGEMENT COMERCIAL INTELIGENTE, SAS DE CV. Bruma 3798C. Valle del Ángel, CP 72040 Puebla, México
contacto@vitabloom.mx +52 222 910 1128 / +52 222 662 0940

No hacer mezclas con productos de reacción alcalina ni bactericidas químicos ni con otros productos sin hacer pruebas previas que demuestren compatibilidad.

Guía de Aplicación

- No aplique en horas de calor intenso, ni cuando exista alta probabilidad de lluvia, ni cuando la velocidad del viento sea alta. Nota (agítese vigorosamente antes de usarse)
- En caso de hacer aplicaciones preventivas o correctivas de bactericidas, dejar un periodo de al menos 4 días antes de aplicar nuestros productos.
- Evitar aplicación en horas de calor, de preferencia aplicar muy temprano o por la tarde, NUNCA A SUELO SECO
- Antes de aplicar, AGITE VIGOROSAMENTE EN SU ENVASE
- Aplicar SIEMPRE A SUELO HÚMEDO
- Diluir cada dosis en 200 Lts de agua
- Siempre después de fertilización química y/o foliares
- NO MEZCLAR con otros productos

Dosis Generales

CULTIVOS	DOSIS/HA	APLICACION	ETAPA DE CULTIVO
Hortalizas de Fruto y Hoja	4 lt	Primera	15 a 20 días después del trasplante o germinación
	8 lt	Segunda	Antes del inicio de floración
	8lt	Tercera	Desarrollo de fruto
Caña	10 lt	Primera	20 a 30 cm de desarrollo inicial
	10 lt	Segunda	40 días después de la anterior
	10 lt	Tercera	100 días después de la segunda aplicación
Leguminosas	3 lt	Primera	15 a 20 días después del trasplante o germinación
	9 lt	Segunda	Antes del inicio de floración
	9 lt	Tercera	Desarrollo de vaina
Frutales	8 lt	Primera	Antes del inicio de floración
	8 lt	Segunda	Al cuajado del fruto
	9 lt	Tercera	Desarrollo de fruto
	6 lt	Cuarta	Después del último corte
Maíz Temporalero	4 lt	Primera	15 a 20 días después de la germinación
	6 lt	Segunda	Antes del inicio de floración
	8 lt	Tercera	Desarrollo de fruto
Maiz Riego Rodado	6 lt	Primera	15 a 20 días después de la germinación
	10 lt	Segunda	Antes del inicio de floración
	10 lt	Tercera	Desarrollo de fruto
Maíz Alta Densidad Riego Presurizado	31 lt	En varias aplicaciones	15 a 20 días después de la germinación Hasta el Desarrollo de fruto
Cereales	4 lt	Primera	15 a 20 días después de la germinación
	6 lt	Segunda	Antes del inicio de floración
	8 lt	Tercera	Desarrollo de fruto

Formulado por diversas mezclas multienzimáticas de origen natural para lo cual se utilizan diversos procesos biotecnológicos de sustancias MINERALIZADAS de origen marino, y animal. Adicionalmente, está fortalecido con ácidos silícicos y mas de 43 cepas de microorganismos Fito benéficos.

Biocatalizador orgánico natural sobre la materia orgánica propia de los suelos y de la que adicionalmente se le proporciona transformándola en nutrientes disponibles para la planta, principalmente N,P,S, micronutrientes, enzimas y aminoácidos.

NOTA: Estas son **dosis generales para algunos cultivos.**

Consulte siempre a su técnico especialista en nutrición para las recomendaciones apropiadas de acuerdo al cultivo, condiciones de suelo, etapa fisiológica y densidad de plantación

www.vitabloom.mx

Fabricado por Guanómeros de México, SPR de RL
Comercializadora: MANAGEMENT COMERCIAL INTELIGENTE, SAS DE CV. Bruma 3798C. Valle del Ángel, CP 72040 Puebla, México
contacto@vitabloom.mx +52 222 910 1128 / +52 222 662 0940

No hacer mezclas con productos de reacción alcalina ni bactericidas químicos ni con otros productos sin hacer pruebas previas que demuestren compatibilidad.

Guía de Aplicación

- No aplique en horas de calor intenso, ni cuando exista alta probabilidad de lluvia, ni cuando la velocidad del viento sea alta. Nota (agítese vigorosamente antes de usarse)
- En caso de hacer aplicaciones preventivas o correctivas de bactericidas, dejar un periodo de al menos 4 días antes de aplicar nuestros productos.
- Evitar aplicación en horas de calor, de preferencia aplicar muy temprano o por la tarde, NUNCA A SUELO SECO
- Antes de aplicar, AGITE VIGOROSAMENTE EN SU ENVASE
- Aplicar SIEMPRE A SUELO HÚMEDO
- Diluir cada dosis en 200 Lts de agua
- Siempre después de fertilización química y/o foliares
- NO MEZCLAR con otros productos

Dosis Generales

CULTIVOS	DOSIS/HA	APLICACION	ETAPA DE CULTIVO
Hortalizas de Fruto y Hoja	4 lt	Primera	15 a 20 días después del trasplante o germinación
	8 lt	Segunda	Antes del inicio de floración
	8lt	Tercera	Desarrollo de fruto
Caña	10 lt	Primera	20 a 30 cm de desarrollo inicial
	10 lt	Segunda	40 días después de la anterior
	10 lt	Tercera	100 días después de la segunda aplicación
Leguminosas	3 lt	Primera	15 a 20 días después del trasplante o germinación
	9 lt	Segunda	Antes del inicio de floración
	9 lt	Tercera	Desarrollo de vaina
Frutales	8 lt	Primera	Antes del inicio de floración
	8 lt	Segunda	Al cuajado del fruto
	9 lt	Tercera	Desarrollo de fruto
	6 lt	Cuarta	Después del último corte
Maíz Temporalero	4 lt	Primera	15 a 20 días después de la germinación
	6 lt	Segunda	Antes del inicio de floración
	8 lt	Tercera	Desarrollo de fruto
Maíz Riego Rodado	6 lt	Primera	15 a 20 días después de la germinación
	10 lt	Segunda	Antes del inicio de floración
	10 lt	Tercera	Desarrollo de fruto
Maíz Alta Densidad Riego Presurizado	31 lt	En varias aplicaciones	15 a 20 días después de la germinación Hasta el Desarrollo de fruto
Cereales	4 lt	Primera	15 a 20 días después de la germinación
	6 lt	Segunda	Antes del inicio de floración
	8 lt	Tercera	Desarrollo de fruto

Es una mezcla multi enzimática orgánica, producidas en base a un proceso de fermentación de sustancias de origen marino, mineral y animal, que actúan como nutriente para el desarrollo vegetativo de los cultivos, actuando también como antagonista de patógenos vegetales.

Reduce la necesidad de aplicar fertilizantes químicos en un 50 a 100% debido a que es

Una fuente natural de nitrógeno que sustituye parcialmente la proporcionada por fuentes comerciales, e incrementa la eficiencia de los fertilizantes comerciales químicos u orgánicos. Esto se logra a través de la acción enzimática y de las bacterias en la mineralización de las fuentes adicionadas de nitrógeno, colaborando así en la reducción de volatilización y filtración no aprovechada.

NOTA: Estas son **dosis generales para algunos cultivos.**

Consulte siempre a su técnico especialista en nutrición para las recomendaciones apropiadas de acuerdo al cultivo, condiciones de suelo, etapa fisiológica y densidad de plantación

www.vitabloom.mx

Fabricado por Guanómeros de México, SPR de RL
Comercializadora: MANAGEMENT COMERCIAL
INTELIGENTE, SAS DE CV. Bruma 3798C. Valle del
Ángel, CP 72040 Puebla, México
contacto@vitabloom.mx +52 222 910 1128 / +52
222 662 0940

No hacer mezclas con productos de reacción alcalina ni bactericidas químicos ni con otros productos sin hacer pruebas previas que demuestren compatibilidad.

Guía de Aplicación

- No aplique en horas de calor intenso, ni cuando exista alta probabilidad de lluvia, ni cuando la velocidad del viento sea alta. Nota (agítese vigorosamente antes de usarse)
- En caso de hacer aplicaciones preventivas o correctivas de bactericidas, dejar un periodo de al menos 4 días antes de aplicar nuestros productos.
- Evitar aplicación en horas de calor, de preferencia aplicar muy temprano o por la tarde, NUNCA A SUELO SECO
- Antes de aplicar, AGITE VIGOROSAMENTE EN SU ENVASE
- Aplicar SIEMPRE A SUELO HÚMEDO
- Diluir cada dosis en 200 Lts de agua
- Siempre después de fertilización química y/o foliares
- NO MEZCLAR con otros productos

Dosis Generales

CULTIVOS	DOSIS/HA	APLICACION	ETAPA DE CULTIVO
Hortalizas de Fruto y Hoja	4 lt	Primera	15 a 20 días después del trasplante o germinación
	8 lt	Segunda	Antes del inicio de floración
	8lt	Tercera	Desarrollo de fruto
Caña	10 lt	Primera	20 a 30 cm de desarrollo inicial
	10 lt	Segunda	40 días después de la anterior
	10 lt	Tercera	100 días después de la segunda aplicación
Leguminosas	3 lt	Primera	15 a 20 días después del trasplante o germinación
	9 lt	Segunda	Antes del inicio de floración
	9 lt	Tercera	Desarrollo de vaina
Frutales	8 lt	Primera	Antes del inicio de floración
	8 lt	Segunda	Al cuajado del fruto
	9 lt	Tercera	Desarrollo de fruto
	6 lt	Cuarta	Después del último corte
Maíz Temporalero	4 lt	Primera	15 a 20 días después de la germinación
	6 lt	Segunda	Antes del inicio de floración
	8 lt	Tercera	Desarrollo de fruto
Maíz Riego Rodado	6 lt	Primera	15 a 20 días después de la germinación
	10 lt	Segunda	Antes del inicio de floración
	10 lt	Tercera	Desarrollo de fruto
Maíz Alta Densidad Riego Presurizado	31 lt	En varias aplicaciones	15 a 20 días después de la germinación Hasta el Desarrollo de fruto
Cereales	4 lt	Primera	15 a 20 días después de la germinación
	6 lt	Segunda	Antes del inicio de floración
	8 lt	Tercera	Desarrollo de fruto

Es una mezcla multi enzimática orgánica, producidas en base a un proceso de fermentación de sustancias de origen marino, mineral y animal, que actúan como nutriente para el desarrollo vegetativo de los cultivos, actuando también como antagonista de patógenos vegetales.

Reduce la necesidad de aplicar fertilizantes químicos en un 50 a 100% debido a que es una fuente natural de nitrógeno que sustituye parcialmente la proporcionada por fuentes comerciales, e incrementa la eficiencia de los fertilizantes comerciales químicos u orgánicos. Esto se logra a través de la acción enzimática y de las bacterias en la mineralización de las fuentes adicionadas de nitrógeno, colaborando así en la reducción de volatilización y filtración no aprovechada.

NOTA: Estas son **dosis generales para algunos cultivos.**

Consulte siempre a su técnico especialista en nutrición para las recomendaciones apropiadas de acuerdo al cultivo, condiciones de suelo, etapa fisiológica y densidad de plantación

www.vitabloom.mx

Fabricado por Guanómeros de México, SPR de RL
Comercializadora: MANAGEMENT COMERCIAL
INTELIGENTE, SAS DE CV. Bruma 3798C. Valle del
Ángel, CP 72040 Puebla, México
contacto@vitabloom.mx +52 222 910 1128 / +52
222 662 0940

No hacer mezclas con productos de reacción alcalina ni bactericidas químicos ni con otros productos sin hacer pruebas previas que demuestren compatibilidad.

Guía de Aplicación

- No aplique en horas de calor intenso, ni cuando exista alta probabilidad de lluvia, ni cuando la velocidad del viento sea alta. Nota (agítese vigorosamente antes de usarse)
- En caso de hacer aplicaciones preventivas o correctivas de bactericidas, dejar un periodo de al menos 4 días antes de aplicar nuestros productos.
- Evitar aplicación en horas de calor, de preferencia aplicar muy temprano o por la tarde, NUNCA A SUELO SECO
- Antes de aplicar, AGITE VIGOROSAMENTE EN SU ENVASE
- Aplicar SIEMPRE A SUELO HÚMEDO
- Diluir cada dosis en 200 Lts de agua
- Siempre después de fertilización química y/o foliares
- NO MEZCLAR con otros productos

Dosis Generales

CULTIVOS	DOSIS/HA	APLICACION	ETAPA DE CULTIVO
Hortalizas de Fruto y Hoja	4 lt	Primera	15 a 20 días después del trasplante o germinación
	8 lt	Segunda	Antes del inicio de floración
	8lt	Tercera	Desarrollo de fruto
Caña	10 lt	Primera	20 a 30 cm de desarrollo inicial
	10 lt	Segunda	40 días después de la anterior
	10 lt	Tercera	100 días después de la segunda aplicación
Leguminosas	3 lt	Primera	15 a 20 días después del trasplante o germinación
	9 lt	Segunda	Antes del inicio de floración
	9 lt	Tercera	Desarrollo de vaina
Frutales	8 lt	Primera	Antes del inicio de floración
	8 lt	Segunda	Al cuajado del fruto
	9 lt	Tercera	Desarrollo de fruto
	6 lt	Cuarta	Después del último corte
Maíz Temporalero	4 lt	Primera	15 a 20 días después de la germinación
	6 lt	Segunda	Antes del inicio de floración
	8 lt	Tercera	Desarrollo de fruto
Maíz Riego Rodado	6 lt	Primera	15 a 20 días después de la germinación
	10 lt	Segunda	Antes del inicio de floración
	10 lt	Tercera	Desarrollo de fruto
Maíz Alta Densidad Riego Presurizado	31 lt	En varias aplicaciones	15 a 20 días después de la germinación Hasta el Desarrollo de fruto
Cereales	4 lt	Primera	15 a 20 días después de la germinación
	6 lt	Segunda	Antes del inicio de floración
	8 lt	Tercera	Desarrollo de fruto

Guía de Aplicación

Por su formulación y quelatación, el VITABLOOM FOSFIK permite una rápida respuesta por parte de la planta (foliar-radicular). Es un biofertilizante altamente efectivo y con un marcado efecto cualitativo, sobre los cultivos en que se aplica (momentos de mayor consumo o máxima necesidad durante el ciclo vegetativo, dependiendo del cultivo que se trate una o varias aplicaciones).

El follaje lo absorbe fácilmente, y una vez en el sistema vascular, posee la propiedad de estimular la producción de Fitoalexinas.

FOLIAR: Se debe asperjar después de un riego y durante el crecimiento activo del cultivo para lograr un mejor resultado, y mezclarlo bien con suficiente agua para obtener una mejor cobertura del follaje.

AL SUELO: Se puede aplicar por los diversos sistemas de riego presurizados junto con los fertilizantes, en la última etapa del riego.

Para tener mejores efectos y favorecer una mayor absorción de VITABLOOM FOSFIK® se recomienda realizar las aplicaciones muy temprano por la mañana o al atardecer con el propósito de que el producto quede impregnado el mayor tiempo posible en los tejidos y pueda absorberse mejor.

No realizar aplicaciones foliares en tiempo muy caluroso o muy seco, ni en horas de insolación. Consulte siempre a su técnico especialista en nutrición para las recomendaciones apropiadas de acuerdo a la etapa fisiológica del cultivo

Dosis Generales

Cultivos Anuales, (Granos, Cereales, Hortalizas)	SUELO: 1 a 3 LT/Ha junto con el resto de los fertilizantes, iniciando las aplicaciones 2 semanas después de la emergencia y posteriormente cada mes por 2 a 3 aplicaciones por ciclo.
	FOLIAR: 200 a 300 ml/ha cada mes durante el periodo de crecimiento.
Frutales Mayores de Temporal Mangos, Tamarindos, Aguacates Jaka	SUELO: de 2 a 4lt/ha por aplicación realizando de 2 a 4 aplicaciones por año, en mezcla con los fertilizantes.
	FOLIAR: 200 a 400 ml/ha de agua iniciando al inicio del desarrollo del brote floral hasta el último tercio de la formación de la fruta.
Frutales Mayores con Riego	SUELO: de 1 a 3 lt/ha por aplicación realizando aplicaciones cada 2 a 4 semanas, en mezcla con los fertilizantes.
	FOLIAR: 200 a 400 ml/ha de agua iniciando al inicio del desarrollo del brote floral hasta el último tercio de la formación de la fruta.
Limonos y Cítricos con Riego, Carambolo, Mangostan, Litchies	SUELO: de 1 a 3 lt/ha por aplicación realizando aplicaciones cada 2 a 4 semanas, en mezcla con los fertilizantes.
	FOLIAR: 200 a 400 ml/ha de agua iniciando al inicio del desarrollo del brote floral hasta el último tercio de la formación de la fruta.
Viñedos, Duraznos, Manzanas, Ciruelos y Perales	SUELO: de 2 a 3 lt /ha cada 2 a 4 semanas una vez que se inicien los brotes después de la hibernación
	FOLIAR: 200 a 400 ml/ha 2 semanas de iniciando los brotes vegetativos después de la hibernación y hasta el último tercio de la formación de la fruta.

Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios conocidos. Es incompatible con dicofol, dimetoato, productos que contengan cobre, aceites minerales, azufre y productos formulados ricos en calcio y/o de reacción alcalina productos sulfocálcicos. En los casos en que previamente se haya aplicado productos con cobre deberán transcurrir, al menos, 15 días antes de aplicar VITABLOOM FOSFIK®.

www.vitabloom.mx

Fabricado por Guanómeros de México, SPR de RL

Comercializadora: MANAGEMENT COMERCIAL

INTELIGENTE, SAS DE CV. Bruma 3798C. Valle del Ángel, CP

72040 Puebla, México contacto@vitabloom.mx +52 222 910

1128 / +52 222 662 0940

VITABLOOM ROOTSIL es un biocatalizador específico para biogenerar el sistema radicular compuesto humatos de potasio y hormonas naturales fortalecidos con Ac. Silícicos y Aminoácidos, que produce dos efectos inmediatos induciendo de manera abundante, tanto el desarrollo y crecimiento de raíces, panículas y/o brotes florales y un incremento en la fructificación de frutos o mayor número de granos en los cereales.

Es absorbido fácilmente por el follaje y una vez en el sistema vascular posee la propiedad de promover las reacciones enzimáticas, de promover y explotar el proceso de inducción del sistema radicular, de la floración y fructificación.

Está diseñado para ser usado desde las primeras etapas de desarrollo desde la emergencia y/o trasplante hasta el florecimiento y fructificación.

Guía de Aplicación

- Puede ser suministrado por cualquier vía a las plantas, ha sido especialmente diseñado para inducir y estimular la emisión de nuevas raíces, crecimiento y ramificación así como la inducción de floración y fructificación.
- En general, al ser aplicado al follaje, se debe asperjar después de un riego y durante el crecimiento activo del cultivo en el florecimiento y fructificación, para lograr un mejor resultado.
- Permite una rápida respuesta por parte de la planta (foliar-radicular), en momentos de mayor consumo o máxima necesidad durante el ciclo vegetativo, dependiendo del cultivo que se trate una o varias aplicaciones.
- Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios conocidos. Es incompatible con productos que contengan cobre, y productos de reacción alcalina productos sulfocálcicos.
- En aplicaciones foliares nunca aplique en concentraciones mayores del 4%
- Al mezclar incorpore primero VITABLOOM ROOTSIL® en la mitad del volumen total de agua que va a utilizar, si se va a mezclar con otros productos, adicionar posteriormente el resto de los productos y complementar el volumen total de agua todo esto agitando constantemente la mezcla.
- NOTA: No realizar aplicaciones foliares en tiempo muy caluroso o muy seco, ni en horas de insolación.

Consulte siempre a su técnico especialista en nutrición para las recomendaciones apropiadas de acuerdo al cultivo, condiciones de suelo, etapa fisiológica y densidad de plantación

www.vitabloom.mx

Fabricado por Guanómeros de México, SPR de RL
 Comercializadora: MANAGEMENT COMERCIAL INTELIGENTE, SAS DE CV. Bruma 3798C. Valle del Ángel, CP 72040 Puebla, México
 contacto@vitabloom.mx +52 222 910 1128 / +52 222 662 0940

Dosis Generales

Cultivos Anuales (Granos, Cereales, Hortalizas)	AL SUELO: 1 a 3 LT/Ha junto con el resto de los fertilizantes, iniciando las aplicaciones 2 semanas después de la emergencia y posteriormente cada 7 a 10 días dependiendo del desarrollo del cultivo
	FOLIAR: de 2 a 7 ml/lt de agua al inicio de la formación de la espiga y/o los brotes florales cada 7 a 10 días, hasta el último tercio del desarrollo del grano y/o fruto.
Frutales Mayores de Temporal Mangos, Tamarindos, Aguacates Jaka	SUELO: de 2 a 4 lt /ha por aplicación realizando de 3 a 4 aplicaciones por temporada, en mezcla con los fertilizantes
	FOLIAR: 5 a 10 ml/lt de agua, iniciando al inicio del desarrollo del brote floral hasta el último tercio de la formación de la fruta.
Frutales Mayores con Riego	SUELO: de 2 a 3 lt /ha por aplicación realizando aplicaciones cada 2 semanas, en mezcla con los fertilizantes, Al Trasplante: la misma dosis iniciando desde momento la secuencia de aplicaciones.
	FOLIAR: 5 a 10 ml/lt de agua, iniciando al inicio del desarrollo del brote floral hasta el último tercio de la formación de la fruta.
Limonos y Cítricos con Riego, Carambolo, Mangostan, Litchies	SUELO: de 2 a 3 lt /ha por aplicación realizando aplicaciones cada 2 semanas, en mezcla con los fertilizantes, Al Trasplante: la misma dosis iniciando desde momento la secuencia de aplicaciones.
	FOLIAR: 5 a 10 ml/lt de agua, iniciando al inicio del desarrollo del brote floral hasta el último tercio de la formación de la fruta.
Viñedos, Duraznos, Manzanas, Ciruelos y Perales	SUELO: de 4 a 6 lt /ha cada 2 semanas una vez que se inicien los brotes después de la hibernación
	FOLIAR: 5 a 10 ml/lt de agua, iniciando 2 semanas una vez que se inicien los brotes después de la hibernación y al inicio del desarrollo del brote floral hasta el último tercio de la formación de la fruta.

Faltan:

Casil
Fish+

Dosis Generales

Cultivos Anuales (Granos, Cereales, Hortalizas)	AL SUELO: 1 a 3 LT/Ha junto con el resto de los fertilizantes, iniciando las aplicaciones 2 semanas después de la emergencia y posteriormente cada 7 a 10 días dependiendo del desarrollo del cultivo
	FOLIAR: de 2 a 7 ml/lit de agua al inicio de la formación de la espiga y/o los brotes florales cada 7 a 10 días, hasta el último tercio del desarrollo del grano y/o fruto.
Frutales Mayores de Temporal Mangos, Tamarindos, Aguacates Jaka	SUELO: de 2 a 4 lt /ha por aplicación realizando de 3 a 4 aplicaciones por temporada, en mezcla con los fertilizantes
	FOLIAR: 5 a 10 ml/lit de agua, iniciando al inicio del desarrollo del brote floral hasta el último tercio de la formación de la fruta.
Frutales Mayores con Riego	SUELO: de 2 a 3 lt /ha por aplicación realizando aplicaciones cada 2 semanas, en mezcla con los fertilizantes, Al Traslante: la misma dosis iniciando desde momento la secuencia de aplicaciones.
	FOLIAR: 5 a 10 ml/lit de agua, iniciando al inicio del desarrollo del brote floral hasta el último tercio de la formación de la fruta.
Limonos y Cítricos con Riego, Carambolo, Mangostan, Litchies	SUELO: de 2 a 3 lt /ha por aplicación realizando aplicaciones cada 2 semanas, en mezcla con los fertilizantes, Al Traslante: la misma dosis iniciando desde momento la secuencia de aplicaciones.
	FOLIAR: 5 a 10 ml/lit de agua, iniciando al inicio del desarrollo del brote floral hasta el último tercio de la formación de la fruta.
Viñedos, Duraznos, Manzanas, Ciruelos y Perales	SUELO: de 4 a 6 lt /ha cada 2 semanas una vez que se inicien los brotes después de la hibernación
	FOLIAR: 5 a 10 ml/lit de agua, iniciando 2 semanas una vez que se inicien los brotes después de la hibernación y al inicio del desarrollo del brote floral hasta el último tercio de la formación de la fruta.