

FOSFIK SIL®

Guía de Aplicación

Por su formulación y quelatación, el FOSFIK permite una rápida respuesta por parte de la planta (foliar-radicular). Es un biofertilizante altamente efectivo y con un marcado efecto cualitativo, sobre los cultivos en que se aplica (momentos de mayor consumo o máxima necesidad durante el ciclo vegetativo, dependiendo del cultivo que se trate una o varias aplicaciones). El follaje lo absorbe fácilmente, y una vez en el sistema vascular, posee la propiedad de estimular la producción de Fitoalexinas.

FOLIAR: Se debe asperjar después de un riego y durante el crecimiento activo del cultivo para lograr un mejor resultado, y mezclarlo bien con suficiente agua para obtener una mejor cobertura del follaje.

AL SUELO: Se puede aplicar por los diversos sistemas de riego presurizados junto con los fertilizantes, en la última etapa del riego.

Para tener mejores efectos y favorecer una mayor absorción de FOSFIK® se recomienda realizar las aplicaciones muy temprano por la mañana o al atardecer con el propósito de que el producto quede impregnado el mayor tiempo posible en los tejidos y pueda absorberse mejor.

No realizar aplicaciones foliares en tiempo muy caluroso o muy seco, ni en horas de insolación. Consulte siempre a su técnico especialista en nutrición para las recomendaciones apropiadas de acuerdo a la etapa fisiológica del cultivo

Dosis Generales

Cultivos Anuales, (Granos, Cereales, Hortalizas)	SUELO: 1 a 3 LT/Ha junto con el resto de los fertilizantes, iniciando las aplicaciones 2 semanas después de la emergencia y posteriormente cada mes por 2 a 3 aplicaciones por ciclo.
	FOLIAR: 200 a 300 ml/ha cada mes durante el periodo de crecimiento.
Frutales Mayores de Temporal Mangos, Tamarindos, Aguacates Jaka	SUELO: de 2 a 4lt/ha por aplicación realizando de 2 a 4 aplicaciones por año, en mezcla con los fertilizantes.
	FOLIAR: 200 a 400 ml/ha de agua iniciando al inicio del desarrollo del brote floral hasta el último tercio de la formación de la fruta.
Frutales Mayores con Riego	SUELO: de 1 a 3 lt/ha por aplicación realizando aplicaciones cada 2 a 4 semanas, en mezcla con los fertilizantes.
	FOLIAR: 200 a 400 ml/ha de agua iniciando al inicio del desarrollo del brote floral hasta el último tercio de la formación de la fruta.
Limonos y Cítricos con Riego, Carambolo, Mangostan, Litchies	SUELO: de 1 a 3 lt/ha por aplicación realizando aplicaciones cada 2 a 4 semanas, en mezcla con los fertilizantes.
	FOLIAR: 200 a 400 ml/ha de agua iniciando al inicio del desarrollo del brote floral hasta el último tercio de la formación de la fruta.
Viñedos, Duraznos, Manzanas, Ciruelos y Perales	SUELO: de 2 a 3 lt /ha cada 2 a 4 semanas una vez que se inician los brotes después de la hibernación
	FOLIAR: 200 a 400 ml/ha 2 semanas de iniciando los brotes vegetativos después de la hibernación y hasta el último tercio de la formación de la fruta.

Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios conocidos. Es incompatible con dicofol, dimetoato, productos que contengan cobre, aceites minerales, azufre y productos formulados ricos en calcio y/o de reacción alcalina productos sulfocálcicos. En los casos en que previamente se haya aplicado productos con cobre deberán transcurrir, al menos, 15 días antes de aplicar FOSFIK®.

Fabricado por Guanómeros de México, SPR de RL
Comercializadora: MANAGEMENT COMERCIAL
INTELIGENTE, SAS DE CV. contacto@vitabloom.mx +52 222
910 1128 / +52 222 662 0940