

Su aplicación foliar ayuda al desarrollo de brotes florales

VITABLOOM Rootsil

Ideal para aplicación FOLIAR o RADICULAR, en momentos de mayor consumo o máxima necesidad durante el ciclo vegetativo, permite una rápida respuesta de la planta

Para raíces fuertes, sanas y vigorosas en todo tipo de plantas
LISTO PARA USARSE

Para enraizado y trasplante de esquejes, estacas, bulbos, tejido verde, semi duro o duro.

"NO SE ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS"
"NO SE REUTILICE ESTE ENVASE, DESTRÚYASE"
"NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Evite el contacto con la piel y ojos.
En caso de ingestión aplicar tratamiento sintomático

EN CASO DE INTOXICACION LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRE LA ETIQUETA

ROOTSIL es un biocatalizador específico para biogenerar el sistema radicular compuesto humatos de potasio y hormonas naturales fortalecidos con Ac. silícicos y aminoácidos, que produce dos efectos inmediatos induciendo de manera abundante, tanto el desarrollo y crecimiento de raíces, panículas y/o brotes florales y un incremento en la fructificación de frutos o mayor número de granos en los cereales. Es absorbido fácilmente por el follaje y una vez en el sistema vascular posee la propiedad de promover las reacciones enzimáticas, de promover y explotar el proceso de inducción del sistema radicular, de la floración y fructificación.

Aplicación

Dosis y Aplicación

Plántula:

5ml. por planta una vez por semana durante el primer mes. Después repetir aplicación cada 2 semanas

Semilleros:

2ml. por cubículo 3 días después de la siembra. Repetir la dosis cada 2 semanas.

Esquejes:

Verter producto en un recipiente e introducir por 15 minutos la parte del esqueje que será colocado en la tierra o sustrato.

Corte en suculentas:

Después de dejar secar el área de corte, colocarlo en la tierra o sustrato y aplicar 5ml. por planta cada 2 semanas.

Observaciones

ROOTSIL

está diseñado para aplicaciones radiculares o foliares.

APLICACIÓN RADICULAR.

Recomendado para fortalecer la raíz en las primeras etapas de crecimiento. Aplicar una vez cada 15 días hasta la floración. Asperjar después de un riego. Siempre a suelo húmedo.

APLICACIÓN FOLIAR:

Se recomienda aplicar durante el crecimiento activo del cultivo en el florecimiento y hasta el segundo tercio de la formación del fruto. Para lograr un óptimo resultado, asperjar al follaje después de un riego.

PARA ORQUÍDEAS Y FLORES DELICADAS:

Aplicar una vez al mes, dirigiendo al suelo y al follaje, siempre después de un riego.

No realizar aplicaciones foliares en calor extremo, ni en horas de insolación



Posee la propiedad de estimular reacciones enzimáticas de la planta; promueve y explota el proceso de inducción del sistema radicular, de la floración y fructificación

ATENCIÓN:
Para aplicación foliar, utiliza mochila aspersora, atomizador para fertilizantes o atomizador de uso rudo.

